

## I PRINCIPALI CRITERI DI ECLUSIONE PER LA DONAZIONE DEL SANGUE CORDONALE

- HERPES (solo mamma in gravidanza) = Si se avuto 1-2 volta in gravidanza
- PSORIASI –ROSALIA-CITOMEGALOVIRUS (sia mamma che papà)
- SE PARTO GEMELLARE
- TATUAGGI FATTI ULTIMI 4 MESI
- TIROIDE HASHIMOTO (mamma e papà)
- MORBO DI CHRON
- SE IL PAPA' NON RICONOSCE IL BIMBO
- SE MAMMA E PAPA' SONO STATI ADOTTATI
- COLESTASI GRAVIDICA
- FECONDAZIONE ETEROLOGA
- PAPILOMA VIRUS = NO (NO anche il papà)
- ASMA: se ventolin usato regolarmente **NO** (cortisone), se usato in primavera x allergie **SI** può donare se Ventolin in gravidanza **NO**
- CELIACHIA = se dita priva di glutine SI può donare
- ANEMIA MEDITERRANEA: se solo mamma **SI** può donare – se entrambi i genitori **NO**
- DIABETE DEL PAPA' DI TIPO 1 = **NO**
- CARDIOASPIRINA – ASPIRINETTA – EPARINA = assunte in gravidanza **NO** non si può donare
- EPILESSIA MAMMA E PAPA' **NO**
- FARMACI CON CORTISONE assunti9 in gravidanza = **NO**
- DERMATITE (gestita con cortisone) = (**SI** Può DONARE, DOPO PARERE OSTETRICA)
- IPOTIROIDISMO e IPERTIROIDISMO = **SI** PUO' DONARE SE NON AUTOIMMUNE, DOPO PARERE MEDICO O OSTETRICA)
- DIABETE GESTAZIONALE CON INSULINA COMPENSATA **SI** può donare
- FECONDAZIONE ASSISTITA : OMOLOGA **SI** se non si è assunto cortisone all'inizio gravidanza (portare documentazione all'anamnesi ostetrica)
- **Altre informazioni per il colloquio:**
  1. il colloquio con l' Ostetrica avviene un mese prima del parto e dura 30 minuti ca. previo appuntamento telefonico
  2. Portare tessera Sanitaria plastificata mamma e papà e la cartellina della gravidanza con tutti gli esami e eventuali referti istologici (se ha tolto nei, fatto gastroscopie, ecc.)
  3. Ricordarsi che l'ultimo pap test e HPV deve essere negativo
  4. L'ostetrica chiederà: luogo e data di nascita dei 4 nonni e se nelle 2 famiglie (materne e paterne) ci sono malattie importanti.